



برنامه تغذیه زیتون



شرکت زیست فناوری سبز
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان فاطمی، خیابان
بیستون، کوچه بوعلی سینا غربی، پلاک ۴۷، واحد ۱۰
شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۹۷۲۶۰۰

www.GreenBiotech-co.com



نوع کود	قبل از تورم جوانه‌ها (دی - بهمن)	رشد جوانه‌ها (اواخر فصل سرما)	۱۵ روز قبل از گلدهی (فروردین)	پس از ریزش گلبرگ‌ها (اواخر اردیبهشت)	تشکیل میوه (خرداد ماه)	سخت شدن هسته زیتون (تیر ماه)	تجمع روغن و تغییر رنگ میوه (مهر تا آبان)	پس از برداشت
۱ گوگرد رویش	۰/۵ تا ۱ کیلو در هر هکتار							
۲ تیوباسیلوس	یک بسته برای هر ۵۰ کیلو گوگرد							
۳* کود دامی کامل پوسیده	۲۰ تن در هکتار هر ۲ سال یکبار							
۴ NPK بارور	پک ۳ گانه در ۲۰۰ درخت	پک ۳ گانه در ۲۰۰ درخت			پک ۳ گانه در ۲۰۰ درخت		پک ۳ گانه در ۲۰۰ درخت	
۵ FeZn باور	یک بسته در ۲۰۰ درخت	یک بسته در ۲۰۰ درخت			یک بسته در ۲۰۰ درخت		یک بسته در ۲۰۰ درخت	
۶ رویش ۲ (فسفر بالا)		۸ لیتر در هکتار	۸ لیتر در هکتار		۸ لیتر در هکتار		۴ لیتر در هکتار	
۷ رویش ۳ (اسید هیومیک)		۱۰ لیتر در هکتار	۱۰ لیتر در هکتار		۵ لیتر در هکتار	۵ لیتر در هکتار	۵ لیتر در هکتار	
۸* رویش ۴ (آهن ۶٪)		۳ کیلو در هکتار	۳ کیلو در هکتار	۳ کیلو در هکتار				
۹ سولفات روی قابل حل		۱۵۰ گرم بر درخت	۵۰ گرم بر درخت					
۱۰ سولپیتاس				۵۰ گرم در درخت	۱۰۰ گرم در درخت	۷۵ گرم در درخت	۲۵ گرم در درخت	
۱۱ سولفات آمونیوم		۳۰۰ گرم بر درخت						
اوره				۱۰۰ گرم در درخت	۲۵۰ گرم در درخت	۵۰ گرم در درخت	۱۰۰ گرم در درخت	
۱۲ رویش ۱ (پتاسیم بالا)					محلول ۳ در هزار	محلول ۳ در هزار	محلول ۳ در هزار	
۱۳* آمینو رویش					محلول ۲ در هزار	محلول ۲ در هزار	محلول ۲ در هزار	
۱۴ کلسیم- بور					محلول ۲ در هزار			
۱۵ میکرو رویش					محلول ۲/۵ در هزار			
۱۶ فروت ست رویش		محلول ۲/۵ در هزار					محلول ۲ در هزار	

مقادیر توصیه شده کاملاً عمومی می‌باشد و بسته به شرایط محیطی، آنالیز خاک و برگ و امکانات موجود، متغیر است.

موارد ستاره‌دار (*) را بنا بر توصیه و انتخاب انجام دهید.

محلول پاشی را در ساعات خنک روز و به دور از نور مستقیم آفتاب انجام دهید.

برای مصرف کودها، به دستورالعمل مصرف آن‌ها بر روی بسته محصول و یا سایت شرکت زیست فناوری سبز مراجعه نمایید.

چالکود یا شیار کود

خاک‌دهی یا تزریق در سایه انداز درخت

کود آبیاری

محلول پاشی