



بسمه تعالی

تاریخ: ۹۱، ۹، ۲۵

شماره: ۱۶۷۷ (۹۱ م)

پیوست:

جناب آقای دکتر ساریخانی

با سلام و احترام

با مسرت به اطلاع می‌رساند نوشتار سرکارعالی و همکاران؛

محمدرضا ساریخانی^۱، ناصر علی اصغرزاد، محمدعلی ملبویی

تحت عنوان:

" بهبود تغذیه فسفر در گیاه گندم با تلقیح باکتریهای حل‌کننده فسفات "

با تأیید هیات تحریریه مجله مدیریت خاک و تولید پایدار پذیرفته شده و در شماره‌های آتی این مجله چاپ خواهد شد. از اینکه این مجله را برای انتشار دستاوردهای تحقیقاتی خود انتخاب نموده‌اید سپاسگزار می‌شود.

«نویسنده مسئول مکاتبه

با تقدیم احترام

فرهاد خرمالی



بهبود تغذیه فسفر در گیاه گندم با تلقیح باکتریهای حل کننده فسفات

محمد رضا ساریخانی^۱، ناصر علی اصغر زاده^۲، محمد علی ملبوبی^۳

۱ و ۲- به ترتیب استادیار و استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

۳- دانشیار زیست‌شناسی مولکولی، بخش بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

rsarikhani@yahoo.com

چکیده

فسفر بعد از نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد گیاهان به شمار می‌آید. یکی از روش‌های تامین فسفر مورد نیاز گیاهان بهره‌گیری از توان زیستی خاک و استفاده از ریزسازواره‌های حل کننده فسفات می‌باشد. بدین منظور آزمایش گلخانه‌ای با گیاه گندم بهاره (رقم روشن) و با سه گونه باکتری حل کننده فسفات شامل: *Pantoea* (P5), *Pseudomonas putida* P13 (P13) و *agglomerans* P5 و *Pseudomonas fluorescence* CHAO (CHAO) در یک خاک استریل انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار (P13, P5, CHAO, P13+P5) و تیمار شاهد بدون استفاده از باکتری) در ۳ تکرار به اجرا در آمد. وزن تر و خشک بخش هوایی (در میان دوره و انتهای دوره رشد)، تعداد سنبله و دانه در هر گلدان، وزن دانه، غلظت و مقدار فسفر در بخش هوایی و در دانه اندازه‌گیری شدند. پارامترهای اندازه‌گیری شده در میان دوره رشد (وزن تر و خشک بخش هوایی، همچنین غلظت و مقدار فسفر موجود در آن) در هیچ یک از تیمارهای اعمال شده تفاوتی با هم نشان ندادند. نتایج نشان داد که تیمارهای باکتریایی بر وزن خشک بخش هوایی تأثیری نداشتند هر چند که وزن هزار دانه در تیمار P13+P5 افزایش معنی‌دار نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارهای باکتری به جز تیمار P13 نشان داد. بیشترین تعداد دانه و سنبله در تیمار P5 و CHAO مشاهده شد. بررسی غلظت و مقدار فسفر بخش هوایی نیز افزایش معنی‌دار تیمارهای باکتریایی را به همراه داشت و بیشترین افزایش غلظت و مقدار فسفر بخش هوایی (به ترتیب ۱/۸ و ۱/۱۴ برابر نسبت به شاهد) از ترکیب تیماری P13+P5 به دست آمد. بر اساس نتایج این آزمایش بایستی انتظار داشت که اثر تلقیح باکتریهای حل کننده فسفات را در پایان دوره رشد گیاه مشاهده نمود و در اوسط رشد گیاه شاید نتایج معنی‌داری از حضور آنها در کنار گیاه حاصل نشود.

واژه‌های کلیدی: باکتری حل کننده فسفات، فسفر، گندم، عملکرد دانه، رشد رویشی

مقدمه

فسفر یکی از عناصر غذایی پرمصرف اصلی برای رشد و نمو گیاهان است و مقدار کل آن در خاک ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم می‌باشد (رودریگز و فراگا، ۱۹۹۹). گرچه فسفر به مقدار فراوانی در خاک‌ها به دو شکل آلی و معدنی یافت می‌شود (خان و همکاران، ۲۰۰۷)، اما در مقایسه با سایر عناصر غذایی، فسفر در بیشتر خاک‌ها تحرک و قابلیت جذب کمی دارد. غلظت فسفر محلول در خاک معمولاً خیلی پایین است و در حدود ۱ میلی‌گرم در کیلوگرم یا کمتر می‌باشد (رودریگز و فراگا، ۱۹۹۹؛ خان و همکاران، ۲۰۰۷). از بین اشکال قابل جذب فسفر غالب‌ترین شکل جذبی آن $H_2PO_4^-$ یا HPO_4^{2-} می‌باشد. اشکال معدنی فسفر در خاک به شکل کانی‌های اولیه از قبیل آپاتیت، هیدروکسی آپاتیت یا آکسی آپاتیت یافت می‌شود (پائول، ۲۰۰۷). اغلب خاک‌های کشاورزی منابع بزرگی از فسفر را دارا می‌باشند که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن در نتیجه تجمع حاصل از کاربرد منظم کودهای فسفره است. زیرا بخش زیادی از فسفات معدنی محلول که به شکل کود شیمیایی به خاک اضافه می‌شود تثبیت شده و برای گیاهان غیرقابل استفاده می‌گردد (رودریگز و فراگا، ۱۹۹۹). بنابراین نزدیک به ۸۰ درصد فسفر اضافه شده به خاک ممکن است بر اثر تثبیت به صورت آلی و معدنی و یا حتی فیزیکی برای گیاهان غیر قابل استفاده گردد (راگوتاما و کارتیکیان، ۲۰۰۵). دومین منبع مهم فسفر در خاک ماده

۱. مسئول مکاتبه: rsarikhani@yahoo.com

آلی است. اشکال آلی فسفر ۳۰ تا ۵۰ درصد کل فسفر را در اغلب خاک‌ها به خود اختصاص می‌دهند، اما مقدار آن ممکن است از ۵ تا ۹۵ درصد در نوسان باشد (پائول، ۲۰۰۷). فسفر آلی در خاک بیشتر به فرم فیتات یا اینوزیتول هگزا فسفات می‌باشد. خیلی از ترکیبات فسفر آلی موادی با وزن مولکولی بالا می‌باشند که ابتدا بایستی به فسفات معدنی محلول ($H_2PO_4^-$ یا HPO_4^{2-}) یا فسفات آلی با وزن مولکولی کمتر تبدیل شوند تا توسط سلول جذب گردند (پائول، ۲۰۰۷). گزارش‌های متعددی از توانایی گونه‌های مختلف باکتری در انحلال فسفات معدنی کم محلول از قبیل تری کلسیم فسفات، دی کلسیم فسفات، هیدروکسی آپاتیت و سنگ فسفات وجود دارد و همچنین معدنی شدن فسفات آلی و تبدیل آن به شکل قابل جذب نیز از طریق تولید آنزیم‌های فسفاتاز و فیتاز گزارش شده است (ساریخانی و ملبویی، ۲۰۰۸؛ ملبویی و همکاران، ۲۰۰۹؛ الف، رودریگز و فراگا، ۱۹۹۹؛ الیویرا و همکاران، ۲۰۰۹). در بین باکتری‌هایی با این توانایی، جنس‌های *Pseudomonas* (راثی پور و علی‌اصغرزاد، ۲۰۰۵؛ قادری و همکاران، ۲۰۰۸؛ ملبویی و همکاران، ۲۰۰۹ الف)، *Bacillus* (الیویرا و همکاران، ۲۰۰۹)، *Rhizobium* (علیخانی و همکاران، ۲۰۰۶)، *Pantoea* (جونگ و همکاران، ۲۰۰۲؛ ملبویی و همکاران، ۲۰۰۹ الف)، *Burkholderia* (الیویرا و همکاران، ۲۰۰۹)، *Achromobacter* و *Agrobacterium* (رودریگز و فراگا، ۱۹۹۹) حائز اهمیت هستند. بر اساس این گزارش‌ها، جمعیت‌های متنوعی از باکتری‌های حل‌کننده فسفات در خاک و در ریزوسفر گیاه وجود دارد که شامل گونه‌های هوازی و بی‌هوازی با غالبیت گونه‌های هوازی است. همچنین جمعیت آن‌ها در ریزوسفر در مقایسه با خاک غیر ریزوسفری به مراتب بیشتر می‌باشد (رودریگز و فراگا، ۱۹۹۹).

طبق آمار، سطح زیر کشت گندم در کشور ۷/۰۳ میلیون هکتار برآورد گردیده است که حدود ۶۴ درصد آن دیم و ۳۶ درصد آن (۲/۵۷ میلیون هکتار) آبی است. میزان تولید گندم کشور در سال ۱۳۸۹ حدود ۱۵ میلیون تن بوده است (بی نام، ۲۰۱۱). با توجه به اینکه گندم یکی از محصولات زراعی راهبردی کشور می‌باشد و تامین فسفر برای رشد مطلوب آن یکی از نیازهای اساسی این گیاه راهبردی است. در تامین فسفر مورد نیاز استفاده از توان زیستی خاک به نظر قابل قبول می‌رسد زیرا که بخش اعظم کودهای فسفوره در خاک تثبیت شده و از دسترس گیاه خارج می‌شود (رودریگز و فراگا، ۱۹۹۹). برای این منظور کافی است که سویه‌های باکتری توانمند از نظر انحلال فسفات را از خاک جداسازی و با تلقیح آنها در خاک از کارایی آنها استفاده نمود. ضرورت یافتن جایگزینی مناسب برای انحلال و رهاسازی فسفات‌های تجمع یافته در خاک زمانی بیشتر احساس می‌شود که بدانیم منابع فسفات موجود در خاک قابلیت تامین فسفات مورد نیاز گیاهان برای تولید بهینه آنها را تا ۱۰۰ سال دارا می‌باشد (گلدستاین و همکاران، ۱۹۹۳) و کافی است که این منبع عظیم فسفر را به صورتی برای گیاه قابل جذب و استفاده نمود. فراهمی زیستی فسفر قابل جذب در خاک به نوع گیاه، شرایط و سطح تغذیه‌ای و فلور میکروبی خاک بستگی دارد (خان و همکاران، ۲۰۰۷). گرچه تاکنون آزمایش‌های زیادی در مورد باکتری‌های حل‌کننده فسفات در سرتاسر جهان انجام گرفته است (گور و استوال، ۱۹۷۲؛ هالدر و همکاران، ۱۹۹۰؛ ریچاردسون و هادوباس، ۱۹۹۷؛ چابوت و همکاران، ۱۹۹۶؛ الگاوادی و گور، ۱۹۹۲؛ افضل و همکاران، ۲۰۰۵؛ هان و همکاران، ۲۰۰۶) ولی بررسی توان ریزسازواره‌های بومی در حضور گیاهان مختلف و شرایط متفاوت خاکها نیاز به انجام آزمایشات بیشتری دارد. چنانکه میکانوا و نوکوا (۲۰۰۲) نشان دادند میزان رهاسازی فسفات از منابع معدنی توسط باکتری‌های حل‌کننده فسفات در حضور فسفات محلول کاهش می‌یابد. بنابراین در این تحقیق با بکارگیری سه گونه باکتری حل‌کننده فسفات شامل دو باکتری بومی خاک‌های ایران یعنی P13 و P5 (ملبویی و همکاران، ۲۰۰۹ الف) و یک باکتری غیر بومی CHAO (قادری و همکاران، ۲۰۰۸)، به بررسی کارایی تلقیح گونه‌های فوق بر خواص کمی و تغذیه فسفر گیاه گندم بهاره رقم "روشن" پرداخته شد، تا تاثیر تلقیح باکتری‌های فوق بر گیاه گندم در دو مرحله قبل از به سنبله رفتن (۱/۵ ماه بعد از کاشت) و در انتهای دوره رشد (۴ ماده بعد از کاشت) مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین اثر تلقیح جداگانه و همزمان دو باکتری بومی نیز مشخص شود.

مواد و روش‌ها

آزمایش به صورت گلخانه‌ای در خاک استریل با حضور سه گونه باکتری حل‌کننده فسفات شامل: *Pseudomonas putida* P13 (P13) و *Pantoea agglomerans* P5 (P5) و *Pseudomonas fluorescence* CHAO (CHAO) و با استفاده از گیاه گندم رقم روشن در اتاق کشت پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به اجرا در آمد. باکتریهای P5 و P13 از شرکت زیست فناوری سبز و باکتری CHAO از آزمایشگاه میکروبیولوژی خاک دانشگاه تبریز دریافت شدند. برای استریل نمودن خاک مورد استفاده که خصوصیات آن در جدول ۱ موجود می‌باشد، خاک به مدت ۴۵ دقیقه در دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد و فشار ۱ اتمسفر در اتوکلاو استریل شد. بعد از ضدعفونی گلدانها (ابعاد گلدان ۲۰×۱۵ سانتی متر) در هر گلدان ۱/۵ کیلوگرم خاک استریل استفاده شد (ساربخانی و علی اصغرزاد، ۲۰۱۲). بعد از آبیاری گلدانها تعداد ۲۰ عدد بذر گندم ضدعفونی شده در گلدانها کشت شد، ضدعفونی بذر به ترتیب زیر انجام پذیرفت: شستشو با آب، تیمار با اتانول ۷۰ درصد به مدت ۱ دقیقه، شستشو با آب مقطر استریل، تیمار با محلول وایتکس ۱۰ درصد به مدت ۳ دقیقه و در نهایت شستن با آب مقطر استریل تا رفع بوی ماده ضدعفونی کننده (علی اصغرزاد و همکاران، ۲۰۰۹). بذرها قبل از کشت در عمق یک سانتیمتری از سطح خاک گلدان با زادمایه‌های میکروبی (۱ میلی‌لیتر به ازاء هر بذر) مطابق طرح آزمایشی بکار رفته تلقیح شدند. تلقیح میکروبی به صورت استفاده مستقیم زادمایه میکروبی با بذر و همچنین تلقیح مجدد گلدان (۱ میلی‌لیتر به ازاء هر بذر) بعد از یک هفته انجام پذیرفت. برای آماده سازی مایه تلقیح، باکتریها در محیط LB^۲ (۱۰ گرم پپتون، ۱۰ گرم کلرید سدیم و ۵ گرم عصاره مخمر به ازاء هر لیتر محیط کشت) مایع کشت شدند و بعد از رسیدن به $OD_{600nm}=1$ (10^9 CFU/mL) مورد استفاده قرار گرفتند. قابل ذکر است که در مورد تیمار شاهد به مقدار برابر محیط LB استریل افزوده شد. گلدانها در شرایط کنترل شده اتاقک رشد با مدت زمان روشنائی ۱۴ ساعت (در اواخر دوره رشد ۱۶ ساعت) با دمای روز و شب به ترتیب 25 ± 2 و 15 ± 2 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. رطوبت گلدانها در طول آزمایش در محدوده FC ۰/۸ نگهداری شد. با توجه به میزان ماده آلی خاک (جدول ۱) و با توجه به توصیه کودی بر اساس آزمون خاک (ملکوتی و غیبی، ۲۰۰۰) نیترژن مورد نیاز به مقدار ۱۷۳ میلی‌گرم اوره در ابتدای کشت به هر گلدان (معادل ۳۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار) اضافه شد. بعد از جوانه زنی بذر تعداد آنها در هر گلدان به ۸ عدد کاهش یافت. نیمی از بوته‌ها (۴ عدد) بعد از ۱/۵ ماه از کشت گیاه تماماً برداشت و به منظور تعیین وزن خشک و فسفر کل آن نگهداری شدند. با تکمیل رشد گیاه و کامل شدن سنبله‌بندی گندم (حدود ۴ ماه) تمام بخش هوایی گیاه برداشت شد، وزن تر (منظور نیمه خشک) و خشک بخش هوایی، تعداد سنبله و تعداد دانه و وزن دانه در هر گلدان اندازه گیری شد. بعد از تعیین وزن تر برای بدست آوردن وزن خشک نمونه‌ها، نمونه‌های گیاهی به مدت ۷۲ ساعت در درون آون با دمای ۶۵ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. جهت اندازه‌گیری فسفر، بخش‌های مربوطه با آسیاب برقی و هاون چینی، آسیاب شدند و از الک یک میلی-متری عبور داده شدند. تعیین فسفر بخش هوایی و فسفر دانه مطابق با روش آمز (آمز، ۱۹۶۶) با کمی تغییرات بود. برای این منظور به شیوه زیر اقدام شد. به ازاء ۰/۵ گرم نمونه گیاهی ۱ میلی‌لیتر از محلول ۱۰٪ نیترات منیزیم محلول در اتانول استفاده شد و درون لول-های پیرکس بر روی شعله سوزانده شد، سپس ۰/۵ میلی لیتر $HClO_4$ مطلق به آن افزوده شد و به مدت ۱۵ دقیقه در آب جوشانده شد تا نمونه کاملاً هضم شود. ۱۰ تا ۵۰ میکرولیتر از محلول صاف و رقیق شده فوق برای اندازه گیری فسفر با استفاده از معرف Mix استفاده شد (معرف Mix شامل آمونیم مولیبدات ۰/۴۲ درصد تهیه شده در اسید سولفوریک ۱ نرمال و اسید آسکوربیک ۱۰ درصد می باشد که به نسبت حجمی ۶ به ۱ مخلوط شده‌اند). ترکیب فوق به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد انکوبه شد تا رنگ آبی پدیدار شود سپس میزان جذب نمونه‌ها در طول موج ۸۲۰ نانومتر قرائت شد. با استفاده از محلولهای استاندارد میزان فسفر موجود در بافت گیاهی به دست آمد.

آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و در ۳ تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای اعمال شده به ترتیب شامل *Pseudomonas putida* P13 (P13)، *Pantoea agglomerans* P5 (P5)، *Pseudomonas fluorescence* CHAO (CHAO) و علاوه بر ترکیب دو باکتری *P. putida* P13 و *P. agglomerans* P5 (P13+P5) و یک تیمار شاهد بدون استفاده از باکتری بود. در تیمار باکتری P13+P5 از جمعیت برابر دو باکتری استفاده شد که بعد از مخلوط نمودن آنها جمعیتی معادل با سایر تیمارها (10^9 CFU/mL)

² Luria-Bertani

داشته باشد. تجزیه آماری یا در قالب طرح کاملاً تصادفی یا به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از نرم افزار MSTATC صورت پذیرفت. با این توضیح که پارامترهایی که در دو زمان مختلف نمونه برداری شده بودند مانند فسفر بخش هوایی، وزن تر و خشک بخش هوایی (قبل از به سنبله رفتن و در پایان دوره) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی آنالیز شد و پارامترهایی که صرفاً در انتهای دوره رشد اندازه گیری شدند (نظیر فسفر بذر) در قالب طرح کاملاً تصادفی آنالیز گردید. ابتدا توزیع نرمال داده‌ها بررسی شد و در مواردی که نیاز به تبدیل داده بود از تبدیل داده مناسب (تبدیل Ln) استفاده شد (علیزاده و تاری نژاد، ۲۰۰۲). مقایسه میانگین‌ها به روش LSD انجام پذیرفت و از نرم افزار Excel برای رسم نمودارها استفاده شد. در تمام شکل‌های مربوط به مقایسه میانگین، انحراف معیارها نیز آورده شده است.

کربن آلی (%)	فسفر قابل استفاده (mg/kg)	پتاسیم قابل استفاده (mg/kg)	رس	سیلت (%)	شن (%)	کربنات کلسیم (%)	pH	EC (dS/m)
۱/۲	۱۵	۳۱۰	۳۰	۳۲	۳۸	۸/۱۵	۷/۲	۱/۲

جدول ۱- برخی از خصوصیات اندازه گیری شده خاک مورد استفاده در آزمایش

نتایج و بحث

وزن تر و خشک بخش هوایی

بررسی اثر تیمارها بر وزن تر و خشک بخش هوایی (در میان دوره و پایان دوره رشد) نشان داد که تفاوتی بین تیمارهای استفاده شده و شاهد وجود ندارد (جدول ۲). امیری و همکاران (۲۰۰۹) در استفاده از کود زیستی حل کننده فسفات روی سه رقم گندم چمران، سایونز و گاسکوژن تفاوت معنی‌داری در تیمارهای تلقیحی خود با نمونه شاهد در مورد وزن خشک گیاه مشاهده نکردند. این در حالی است که تلقیح نیشکر با حل کننده‌های فسفات باعث افزایش ۱۲/۶ درصدی عملکرد گیاه شد (سوندارا و همکاران، ۲۰۰۲). نتایج ضد و نقیض در مورد تاثیر افزایشی یا عدم تاثیر باکتریهای حل کننده فسفات در نتایج تحقیقات محققان دیگر نیز مشاهده می‌شود به عنوان نمونه افضل و همکاران (۲۰۰۵) در بررسی دو سویه باکتری سودوموناس و باسیلوس به عنوان حل کنندگان فسفات مشاهده نمودند که عملکرد بیولوژیک گیاه گندم در تیمار تلقیحی هر چند روند افزایشی داشت اما با نمونه شاهد از نظر آماری تفاوتی نشان نداد. ذبیحی و همکاران (۲۰۰۹) نیز نتیجه مشابهی را در آزمایش گلدانی کاشت گندم و در حضور باکتری *P. fluorescence* سویه ۱۵۳ در شرایط بدون استفاده از کود فسفره مشاهده نمودند این در حالی بود که همین سویه در آزمایش مزرعه‌ای در مقایسه با نمونه شاهد دارای عملکرد بیولوژیک بالاتری بود. محمدی و همکاران (۲۰۱۱) در استفاده همزمان کود زیستی بارور ۲ در سطوح مختلف فسفر (۰، ۲۵ و ۵۰ کیلوگرم در هکتار) در کشت مزرعه‌ای گیاه نخود رقم هاشم عنوان نمودند که وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک غلاف با افزایش سطوح فسفر گرچه افزایش می‌یابد اما فراهمی بیشتر فسفر از اثر باکتریهای حل کننده فسفات می‌کاهد به شکلی که در سطح کودی ۵۰ کیلوگرم در هکتار پارامترهای فوق با تلقیح کود بارور ۲ کاهش معنی‌داری نسبت به عدم تلقیح باکتری نشان داد. میراحمدی و همکاران (۲۰۱۱) در مطالعه گلخانه‌ای روی گیاه ذرت و با دو سویه حل کننده فسفات به نام‌های *Azotobacter chroococcum* Strain 5 و *P. fluoresces* Strain 187 نتایج متفاوتی را گزارش کردند. آنها عنوان داشتند که در تیمار تلقیحی

سوپرفسفات تریپل (۵۸ میلی گرم در کیلوگرم) بعلاوه باکتریهای حل کننده فسفات در مقایسه با تیمار ۲۸ میلی گرم در کیلوگرم و شاهد بیشترین وزن خشک گیاه حاصل شد.

با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد نوع گیاه مورد استفاده، سویه باکتری حل کننده فسفات و همچنین شرایط آزمایش در نتایج به دست آمده تاثیرگذار بوده اند.

جدول ۲- تجزیه واریانس تأثیر تلقیح میکروبی باکتریهای حل کننده فسفات بر میزان وزن تر، وزن خشک و غلظت و مقدار فسفر قبل از سنبله رفتن (در میان دوره رشد گیاه) و پایان دوره رشد گیاه

میانگین مربعات					
منابع تغییرات	درجه آزادی	وزن تر در هر گلدان	وزن خشک در هر گلدان	غلظت فسفر بخش هوایی	مقدار فسفر بخش هوایی
زمان	۱	۸۵/۱۷۷**	۱۷/۷۵**	۲۰/۵**	۰/۳۸۹*
تیمارهای میکروبی	۴	۵/۵۹ ^{NS}	۰/۰۵۱ ^{NS}	۰/۷۹۷**	۰/۷۴*
تیمارهای میکروبی × زمان	۴	۱۰/۸۰ ^{NS}	۰/۰۴۳ ^{NS}	۰/۱۲۱ ^{NS}	۰/۱۴۵ ^{NS}
خطا	۲۰	۱۳/۴۴	۰/۱۲۹	۰/۱۵۷	۰/۲۰۴
ضریب تغییرات		۱۷/۱۴	۴۳/۸۴	۴۶/۷۹	۴۵/۳۸

NS عدم وجود اختلاف معنی دار؛ ** معنی دار در سطح ۱٪؛ * معنی دار در سطح ۵٪

جدول ۳- تجزیه واریانس تأثیر تلقیح میکروبی باکتریهای حل کننده فسفات بر برخی خصوصیات مرتبط با عملکرد گیاه گندم و فسفر دانه (پارامترهای اندازه گیری شده در پایان دوره رشد گیاه)

میانگین مربعات					
منابع تغییرات	درجه آزادی	تعداد سنبله در هر گلدان	تعداد دانه در هر گلدان	وزن دانه در هر گلدان	وزن هزار دانه
تیمارهای میکروبی	۴	۲/۷۶*	۱۰۵۵/۶*	۲/۳۳۸	۹۰۲/۱۳۸**
خطا	۱۰	۰/۶۶	۲۵۴/۱۳	۰/۷۸۷	۱۳۰/۶۲۹
ضریب تغییرات		۱۱/۲۹	۵۴/۶۴	۲۰/۵۹	۲۴/۴۷


NS عدم وجود اختلاف معنی دار؛ ** معنی دار در سطح ۱٪؛ * معنی دار در سطح ۵٪

تعداد سنبله و دانه در هر گلدان

تجزیه واریانس داده ها (جدول ۳) نشان داد که اثر تیمارهای باکتریایی بر تعداد سنبله و تعداد دانه در هر گلدان معنی دار است ($P < 0.05$). در مورد صفت تعداد سنبله در گلدان، بیشترین میانگین مربوط به تیمار ترکیب دو باکتری حل کننده فسفات P13 و P5 و کمترین میانگین مربوط به تیمار باکتری P5 بود (شکل ۱). گرچه بیشترین تعداد سنبله مربوط به ترکیب تیماری P13+P5 می باشد

اما با نمونه شاهد بدون تلقیح باکتری تفاوت آماری نشان نداد. مقایسه میانگین تعداد دانه در هر گلدان نشان داد که تفاوت معنی داری بین هیچ یک از تیمارهای باکتریایی اعمال شده با شاهد (بدون تلقیح باکتریایی) وجود نداشت. جعفرزاده ذغالچالی و همکاران (۲۰۱۱) در آزمایشی که روی گیاه برنج و در حضور سه سویه باکتری *P. fluorescence* به نام‌های ۱۶۹، ۱۷۰ و ۴۲۳ انجام دادند مشاهده کردند که کاربرد سویه‌های فوق تعداد پنجه و سنبله گیاه را افزایش نداد است. افضل و همکاران (۲۰۰۵) نیز در آزمایش خود افزایشی در پارامترهایی نظیر ارتفاع گیاه گندم، تعداد پنجه، تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله مشاهده نکردند. اما افضل و بانو (۲۰۰۸) عنوان کردند که استفاده همزمان باکتریهای حل کننده فسفات به همراه کود فسفره در مقایسه با زمانی که کود فسفره به تنهایی به گیاه گندم داده می‌شود باعث افزایش ۳۰-۴۰ درصدی عملکرد دانه می‌شود.


به نظر این ویژگی متاثر از نوع گیاه و رقم آن و همچنین سویه‌های استفاده شده در آزمایشات مختلف بوده و از طریق ویژگیهای محرک رشد نظیر تولید هورمون‌های مختلف شاید در بهبود این پارامتر تاثیرگذار بوده‌اند.



شکل ۱- مقایسه میانگین

اثر تیمارهای باکتریایی بر

تعداد سنبله در هر گلدان.



شکل ۲- مقایسه میانگین اثر تیمارهای باکتریایی بر تعداد دانه در هر گلدان.


وزن دانه در هر گلدان و وزن هزاردانه

نتایج نشان داد که صفت کمی وزن دانه در هر واحد آزمایشی (گلدان) که یکی از پارامترهای اندازه‌گیری شده بسیار مهم می‌باشد، معنی دار نشد (جدول ۳). مقایسه میانگین مربوط به وزن هزاردانه (شکل ۳) نشان داد که بیشترین مقدار آن مربوط به ترکیب تیماری P13+P5 است. وزن هزار دانه در تیمار P13+P5 افزایش معنی دار نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارهای باکتری به جز تیمار P13 نشان داد. افزایش وزن هزاردانه را می‌توان مربوط به بهبود تغذیه فسفوری و سایر اثرات تحریک‌کنندگی رشد گیاه توسط این باکتریها دانست. معمولاً باکتریهای حل کننده فسفات ممکن است از سایر روشها نظیر تولید هورمونها، سایدروفورها و غیره بر رشد گیاه تاثیرگذار باشند (قادری و همکاران، ۲۰۰۸؛ هان و همکاران، ۲۰۰۶).

بهراری ساروی و همکاران (۲۰۱۱) در بررسی تأثیر میکروارگانیسیم‌های محرک رشد و حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (لاین N80) سه نوع کود زیستی بارور ۲، نیتروکسین و سوپرنیتروپلاس را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج آزمایش آنها نشان داد

که کود های زیستی بر صفات وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت تأثیر معنی دار داشته‌اند. بیشترین عملکرد در سطح کودی ۷۵ کیلوگرم در هکتار کود اوره برای کود زیستی بارور ۲ (حاوی باکتریهای P13 و P5 مورد استفاده در این آزمایش) و نیتروکسین به دست آمد، همچنین وزن هزاردانه با کاربرد هر سه نوع کود زیستی در مقایسه با شاهد افزایش نشان داد. ملبوبی و همکاران (۲۰۰۹) در بررسی اثر باکتریهای حل کننده فسفات P13 و P5 در گیاه سیب زمینی، عنوان داشتند عملکرد غده سیب زمینی تحت تاثیر تلقیح دو باکتری فوق بوده و به صورت معنی دار افزایش یافته است هر چند بین غلظت فسفر موجود در برگ گیاه سیب زمینی تفاوت معنی داری با شاهد مشاهده نشده است.


استفاده از باکتریهای حل کننده فسفات در برخی موارد وقتی به تنهایی در تیمار آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته‌اند تأثیری معنی-داری بر افزایش عملکرد محصول نداشته‌اند اما زمانیکه با کود دامی یا کود شیمیایی تلفیق شده‌اند افزایش عملکرد محصول گزارش شده است (افضل و همکاران ۲۰۰۵). حامدا و همکاران (۲۰۰۶) بعد از جداسازی بیش از ۲۰۰ باکتری حل کننده فسفات، ۵ سویه برتر را که علاوه بر حل کنندگی فسفات دارای سایر ویژگی‌های PGPR ی بودند را در یک آزمایش بر روی رشد گیاه ذرت بررسی کرده و افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی بیوماس گیاهی را گزارش کردند. آنها اثر باکتری‌های فوق را در آزمایش گلخانه‌ای و مزرعه‌ای مورد بررسی قرار دادند و افزایش معنی دار برخی از پارامترهای اندازه‌گیری شده از قبیل بیوماس خشک گیاهی، طول ساقه و وزن دانه (عملکرد) را در حضور *Pseudomonas sp.* و *Serratia marcescens* مشاهده نمودند.



شکل ۳- مقایسه میانگین اثر باکتریها بر وزن هزاردانه.

غلظت و مقدار فسفر بخش هوایی و دانه


با توجه به اینکه تاثیر اصلی باکتری‌های حل کننده فسفات در بهبود تغذیه فسفر گیاه می‌باشد، اندازه‌گیری فسفر موجود در بخش هوایی و دانه گیاه مورد توجه بود. غلظت و مقدار فسفر بخش هوایی در دو دوره رشد گیاه (اواسط دوره رشد و پایان دوره رشد) اندازه-گیری شد. آنالیز آماری نشان داد که غلظت و مقدار فسفر بخش هوایی در ۱/۵ ماه بعد از کشت گیاه تحت تاثیر تیمارهای باکتریهای حل کننده فسفات نبوده است، اما نتایج تجزیه واریانس غلظت و مقدار فسفر بخش هوایی در پایان دوره نشان داد که اثر تیمارها به ترتیب در سطح ۱ درصد و ۵ درصد معنی دار بوده است (جدول ۲). چنان‌که در شکل ۴ دیده می‌شود بیشترین غلظت فسفر در بخش هوایی مربوط به ترکیب تیماری P13 بعلاوه P5 می‌باشد و همه تیمارهای باکتری اعمال شده (به جز تیمار P5) با شاهد تفاوت معنی-دار نشان داده‌اند هر چند بین تیمارهای باکتریایی اختلاف از نظر آماری معنی دار نمی‌باشد.



شکل ۴- مقایسه میانگین اثر تیمارهای باکتریایی بر درصد فسفر بخش هوایی.

آنالیز واریانس مقدار فسفر بخش هوایی نشان داد که بین تیمارها اختلاف در سطح ۰.۵٪ وجود دارد و همانند غلظت فسفر در بخش هوایی، مقدار فسفر نیز در مورد تیمارهای باکتریایی نسبت به تیمار شاهد دارای میانگین بالاتری است. مقایسه میانگین تیمارهای اعمال شده بر روی مقدار فسفر بخش هوایی در شکل ۵ قابل مشاهده است. نتایج آن با غلظت فسفر بخش هوایی منطبق بوده و نشان می‌دهد که بین تیمارهای باکتریایی استفاده شده اختلافی وجود ندارد اما ترکیب تیماری دو باکتری P5 و P13 در مقایسه با شاهد از نظر مقدار فسفر بخش هوایی گیاه، اختلاف معنی‌دار نشان داد و بیشترین مقدار فسفر گزارش شده مربوط به این تیمار بود. جعفرزاده ذغالچالی و همکاران (۲۰۱۱) افزایش میزان غلظت فسفر در برگ و بذر برنج در تیمارهای تلقیح شده با باکتری سودوموناس سویه ۱۶۹ را گزارش نمودند و بیشترین افزایش جذب فسفر نسبت به شاهد را به میزان ۰.۴/۷٪ و ۰.۹/۴٪ به ترتیب در برگ و بذر برنج مشاهده کردند.

اندازه‌گیری درصد فسفر دانه (غلظت فسفر) نشان داد که بین تیمارهای باکتریایی اختلاف آماری وجود ندارد (جدول ۳). این در حالی است که افضل و همکاران (۲۰۰۵) در آزمایش خود که بر روی گندم و در حضور دو باکتری سودوموناس و باسیلوس به عنوان حل‌کنندگان فسفات انجام دادند، هیچگونه افزایشی در درصد فسفر دانه گندم در تیمار میکروبی در مقایسه با شاهد مشاهده نکردند اما زمانیکه باکتریهای فوق با مواد آلی به میزان ۱۰ تن در هکتار تلفیق شده و به عنوان یک تیمار بکار گرفته شدند افزایش فسفر موجود در دانه گندم را مشاهده نمودند.



شکل ۵- مقایسه میانگین اثر تیمارهای باکتریایی بر مقدار فسفر بخش هوایی.

در آزمایشی که توسط رائی‌پور و علی‌اصغرزاد (۲۰۰۵) در حضور باکتری‌های حل‌کننده فسفات و باکتری تثبیت کننده نیتروژن انجام گرفت، آنها به رابطه هم‌افزایی باکتریها اشاره داشته و بهبود تغذیه فسفوری و جذب بیشتر فسفر در گیاه میزبان را در حضور این باکتریها گزارش دادند. آنها همچنین در مطالعه خود به این موضوع اشاره داشتند که در این رابطه سه گانه بین گیاه، باکتری تثبیت کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفات، فراهمی فسفات از جانب باکتری حل‌کننده فسفات باعث ترغیب همزیستی شده (فسفر عنصری لازم برای تثبیت نیتروژن و شکل‌گیری گره می‌باشد) و شاخص‌هایی چون تعداد گره، وزن گره افزایش یافته است. مشابه این نتایج را زایدی و خان (۲۰۰۶) در مشارکت قارچ گلووموس فسیکولاتوم، باکتری برادی ریزوبیوم و باکتری محرک رشد گیاه باسیلوس سابتیلیس عنوان داشتند و افزایش عملکردی تا ۲۴ درصد مشاهده نمودند.

اسیتکن و همکاران (۲۰۰۹) با استفاده از ۳ باکتری PGPR به نام‌های *Pseudomonas* BA-8، *Bacillus* OSU-142 و *Bacillus* M-3 به بررسی اثر آنها بر رشد و عملکرد محصول و سطح عناصر غذایی توت فرنگی پرداختند. نتایج نشان داد که عملکرد محصول و میزان فسفر و روی در برگ گیاهان تیمار شده در مقایسه با شاهد افزایش معنی‌داری داشتند.

در دهه‌های اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با استفاده از باکتری‌های حل‌کننده فسفات انجام گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان داده است که مکانیسم‌های زیادی مسئول افزایش رشد و عملکرد در گیاهان می‌باشند. علاوه بر افزایش جذب عناصر غذایی، تولید

هورمون‌های گیاهی به وسیله ریزجانداران در ریزوسفر گیاه، توان تولید ACC^۲ دآمیناز، کنترل پاتوژن‌های گیاهی، قدرت حل‌کنندگی فسفات و تولید سیدروفور از جمله مکانیسم‌های افزایش رشد و عملکرد در گیاهان می‌باشد (گلیک و همکاران، ۱۹۹۵؛ هان و همکاران، ۲۰۰۶). گلیک و همکاران (۱۹۹۵) اعلام نمودند که شواهدی دال بر افزایش فراهمی عناصر غذایی گیاه در ریزوسفر به دلیل فعالیت باکتریهای ریزوسفری محرک رشد و حل‌کننده فسفات وجود دارد. فرآیند عمل در این مورد شامل افزایش انحلال عناصر غذایی و یا تولید مواد کلات‌کننده می‌باشد. تولید اسیدهای آلی باعث افزایش اسیدی شدن محیط اطراف ریشه می‌شود، در نتیجه در اثر جایگزینی پروتون به جای کلسیم، فسفر آزاد می‌شود، که اسید گلوکونیک یکی از این اسیدها می‌باشد. مکانیسم‌های دیگری برای انحلال فسفر پیشنهاد شده‌اند که عبارتند از تولید مواد کلات‌کننده، تولید اسیدهای معدنی از قبیل اسید سولفوریک، اسید نیتریک و اسید کربنیک به وسیله ریزجانداران خاک می‌باشد (گیانشوار و همکاران، ۲۰۰۲). تولید آنزیم‌های فسفاتاز نیز راهکار دیگری برای رهاسازی فسفات از منابع آلی فسفات می‌باشد (ساریخانی و همکاران، ۲۰۱۰). به نظر باکتریهای استفاده شده در این آزمایش به ویژه ترکیب باکتری P13 و P5 که به ترتیب دو باکتری دارای فعالیت فسفاتازی و تولید اسیدهای آلی بالایی هستند (ساریخانی و همکاران، ۲۰۱۰؛ ملبوبی و همکاران، ۲۰۰۹ الف) در انحلال منابع فسفات موجود در خاک دخالت داشته و همین موضوع باعث بالا رفتن غلظت و مقدار این عنصر در بافت خشک گیاهی در انتهای دوره رشد گیاه شده است. شاید سایر اثرات تحریک‌کنندگی رشد گیاه توسط این باکتریها به افزایش پارامتری چون وزن هزاردانه و بهبود جذب عنصر فسفر کمک نموده است. عدم تاثیرگذاری باکتریها در فاصله ۱/۵ ماه از شروع کشت را شاید بتوان به زمان مربوط دانست و اینکه برای مشاهده اثرات مطلوب این باکتریها نیاز به زمان بیشتری می‌باشد.

نتیجه‌گیری

طبیعی است که پاسخ گیاهان مختلف به تلقیح میکروبی یکسان نبوده و علاوه بر آن شرایط آزمایش از قبیل نوع گیاه، رقم گیاه، نوع آزمایش‌گلدانی یا مزرعه‌ای، حاصلخیزی خاک مورد آزمایش و سایر عوامل نظیر کاربرد کود یا مواد اصلاحی دیگر در کارایی پاسخ گیاه به تلقیح میکروبی می‌تواند تاثیرگذار باشد. بر اساس نتایج این آزمایش افزایش وزن هزاردانه در استفاده همزمان دو باکتری *P. putida* P13 و *Pantoea agglomerans* P5 حاصل شد. همچنین در حضور باکتریهای فوق بهبود تغذیه فسفری گیاه در اندام هوایی (برگ) در پایان دوره رشد گیاه کاملاً بارز و مشخص می‌باشد ولی انتقال آن از برگ به اندامهای ذخیره‌ای گیاه (دانه) شاید تحت عوامل دیگری بوده است که افزایش درصد فسفر دانه در تیمار باکتری مشاهده نشد. بعلاوه استفاده از باکتری CHAO که در سایر آزمایشات اثرات مثبت آن تائید شده بود به عنوان محکی در این آزمایش به همراه سویه‌های بومی استفاده شد تا مقایسه‌ای بین آنها صورت پذیرد و نتایج به دست آمده، قابلیت سویه‌های بومی را تائید نمود. به نظر می‌رسد ترکیب تیماری باکتری P13 و P5 که به عنوان کود زیستی بارور ۲ به تولید تجاری رسیده می‌تواند در تامین فسفات گیاه نقش ایفا کند اما تاثیرگذاری آن را در پایان دوره رشدی گیاه بایستی انتظار داشت چرا که در فاصله ۱/۵ ماه بعد از تلقیح گیاه میزبان با باکتریهای حل‌کننده فسفات هیچ‌گونه تغییر معنی‌داری در پارامترهای اندازه‌گیری شده مشاهده نشد.

- Afzal, A., Ashraf, M., Asad, S.A., and Farooq, M. 2005. Effect of phosphate solubilizing microorganisms on phosphorus uptake, yield and yield traits of Wheat (*Triticum aestivum* L.) in rainfed area. *Inter. J. Agri. Biol.* **7: 2.** 207-209.
- Afzal, A., and Bano, A. 2008. *Rhizobium* and phosphate solubilizing bacteria improve the yield and phosphorus uptake in wheat (*Triticum aestivum* L.). *Inter. J. Agri. Biol.* **10:** 85-88.
- Alagawadi, A.R., and Gaur, A.C. 1992. Inoculation of *Azospirillum brasilense* and phosphate-solubilizing bacteria on yield of sorghum (*Sorghum bicolor* L.) Moench] in dry land. *Trop Agric.* **69:** 347-50.
- Aliasgharzad, N., Shirmohamadi, E., and Oustan, S. 2009. Siderophore production by mycorrhizal sorghum roots under micronutrient deficient condition. *Soil Environ.* **28: 2.** 119-123.
- Alikhani, H.A., Sale-Rastin, N., and Antoun, H. 2006. Phosphate solubilization activity of Rhizobia native to Iranian soils. *Plant Soil.* **287:** 35-41.
- Anonymous. 2011. Statistical Data of Iran Agriculture. Ministry of Jihad-e-Agriculture. Tehran, Iran. **182p. (In Persian)**
- Ames, B.N. 1966. Assay of Inorganic Phosphate, Total Phosphate and Phosphatases. In: E. Neufeld and V. Ginsburg, (eds.) *Methods in Enzymology*, Vol. VIII: Complex Carbohydrates. Academic Press, New York, NY, **Pp: 115-118.**
- Amiri, M.B., Rezvani Moghaddam, P., Ghorbani, R., Fallahi, J., and Fallah poor, F. 2009. Effects of biofertilizers on seedling growth of different cultivars of wheat (Chamran, Sayones and Gaskogen). The First National Symposium on Agriculture and Sustainable Development. Opportunities and Future Challenges. Azad University of Shiraz. Shiraz. (In Persian)
- Bahari Saruei, S.H., Pirdashti, H., Esmaeili, M.A., and Mansuri, A. 2011. Study the effect of plant growth promoting and phosphate solubilizing microorganisms on the yield of wheat (line N80). 12th Iranian Soil Science Congress. University of Tabriz. Tabriz, Iran. (In Persian)
- Chabot, R., Hani, A., and Cescas, P.M. 1996 Growth promotion of maize and lettuce by phosphate-solubilizing *Rhizobium leguminosarum* biovar. *phaseoli*. *Plant Soil.* **184:** 311-21.
- Esitken, A., Yildiz, H.E., Ercisli, S., Figen Donmez, M., Turan, M., and Gunes, A. 2009. Effects of plant growth promoting bacteria (PGPB) on yield, growth and nutrient contents of organically grown strawberry. *Ecological Engineering.* **33:** 150-156.
- Gaur, A.C., and Ostwal, K.P. 1972. Influence of phosphate dissolving Bacilli on yield and phosphate uptake of wheat crop. *Indian J. Exp. Biol.* **10:** 393-4.
- Ghaderi, A., Aliasgharzad, N., Oustan, S. and Olsson, P.A. 2008. Efficiency of three *Pseudomonas* isolates in releasing phosphate from an artificial variable-charge mineral (iron III hydroxide). *Soil Environ.* **27:** 71-76.
- Glick, B.R., Karaturovic, D.M., and Newell, P.C. 1995. A novel procedure for rapid isolation of plant growth promoting *Pseudomonads*. *Can. J. Microbiol.* **41:**533-536.
- Goldstein, A.H., Rogers, R.D., and Mead, G., 1993. Mining by microbe. *Biol. Technol.* **11:** 1250-1254.
- Gyaneshwar, P., Naresh Kumar, G., Parekh, L.J., and Poole, P.S. 2002. Role of soil microorganisms in improving P nutrition of plants. *Plant Soil.* **245:** 83-93.
- Halder, A.K., Mishra, A.K., Bhattacharyya, P., and Chakrabartty, P.K. 1990. Solubilization of rock phosphate by *Rhizobium* and *Bradyrhizobium*. *J. Gen. Appl. Microbiol.* **36:** 81-92.
- Hameeda, B., Harini, G., Rupela, O.P., Wani, S.P., and Reddy, G. 2008. Growth promotion of maize by phosphate solubilizing bacteria isolated from composts and macrofauna. *Microbiol. Res.* **163:** 234-242.
- Han, H.S., Supanjani, D., and Lee, K.D. 2006. Effect of co-inoculation with phosphate and potassium solubilizing bacteria on mineral uptake and growth of pepper and cucumber. *Plant Soil Environ.* **52: 3.** 130-136.
- Illmer, P., and Schinner, F. 1992. Solubilization of inorganic phosphates by microorganisms isolated from forest soil. *Soil Biol. Biochem.* **24:** 389-95.

- Jafarzadeh Zoghalchi, H., Fallah Nosratabadi, A., Rajabi, C., and Mohammadzadeh Nuri, J., 2011. Study the effect of PGPR with the ability of phosphate solubilizing on decreasing of phosphate chemical fertilizer uses in rice (*Oriza sativa* L.). 12th Iranian Soil Science Congress. University of Tabriz. Tabriz, Iran. (In Persian)
- Jung, I., Park, D.H., and Park, K. 2002. A study of the growth condition and solubilization of phosphate from hydroxyapatite by *pantoea agglomerans*. Biotechnol. Bioprocess Engineering. 7: 201-2015.
- Khan, M.S., Zaidi, A., and Wani, P.A. 2007. Role of phosphate-solubilizing microorganisms in sustainable agriculture-a review. Agro. Sustain. Develop. 27: 29-43.
- Malakuti, M.J. 2004. Balanced nutrition of wheat. Second edition. Nashre Amuzeshe Keshavarzi, Karaj, Iran. 544p. (In Persian)
- Malakuti, M.J., and Gheybi, M.N. 2000. Determining of nutrient critical levels in soil, plant and fruits. Nashre Amuzeshe Keshavarzi, Karaj, Iran. 92p. (In Persian)
- Malboobi, M.A., Behbahani, M., Madani, H., Owlia, P., Deljou, A., Yakhchali, B., Moradi, M., and Hassanabadi, H. 2009b. Performance evaluation of potent phosphate solubilizing bacteria in potato rhizosphere. World J. Microbiol. Biotech. 25: 1479-1484.
- Malboobi, M.A., Owlia, P., Behbahani, M., Sarokhani, E., Moradi, S., Yakhchali, B., Deljou, A., and Morabbi Heravi, K. 2009a. Solubilization of organic and inorganic phosphates by three highly efficient soil bacterial isolates. World J. Microbiol. Biotech. 25: 1471-1477.
- Mikanova, O., Kubat, J., Simon, T., Vorisek, K., and Randova, D. 1997. Influence of soluble phosphate on P-solubilizing activity of bacteria. Rostlinna Vyroba-UZPI. 43: 421-4.
- Mikanova, O., and Novakova, J. 2002. Evaluation of the P-solubilizing activity of soil microorganisms and its sensitivity to soluble phosphate. Rostlinna Vyroba. 48: 9. 397-400.
- Mirahmadi, M., Malakuti, M.J. and Khavazi, K. 2011. Effect of PSB on P uptake by corn in alkaline soils. 12th Iranian Soil Science Congress. University of Tabriz. Tabriz, Iran. (In Persian)
- Mohammadi, A., Asghari, H.R., Abasdokht, H., and Rahimi, M. 2011. Effect of Mycorrhiza and Barvar2 on root colonization and some features of Pea (Hashem cultivar) at various levels of phosphorus fertilization. 1st National Conference on Modern Agricultural Sciences and Technologies. University of Zanjan. Zanjan, Iran. (In Persian)
- Oliveira, C.A., Alves, V.M.C., Marriel, I.E., Gomes, E.A., Scotti, M.R., Carneiro, N.P., Guimaraes, C., Schaffert, R.E., and Sa, N.M.H. 2009. Phosphate solubilizing microorganisms isolated from rhizosphere of maize cultivated in an oxisol of the Brazilian Cerrado Biome. Soil Biol. Biotech. 41: 1782-1787.
- Paul, E.A. 2007. Soil Microbiology and Biochemistry. Third edition. Linacre House, Jordan Hill, Oxford, UK. Pp: 391-400.
- Raghothama, K.G., and Karthikeyan, A.S. 2005. Phosphate acquisition. Plant Soil. 274: 37-49.
- Rasi Poor, L., and Aliasghar Zad, N. 2005. Interaction of phosphate solubilizing bacteria and *Bradyrhizobium japonicum* on yield and nutrient uptake by Soybean. Agri. Science. 15: 4. 141-156. (In Persian)
- Richardson, A.E., and Hadobas, P.A. 1997. Soil isolates of *Pseudomonas* spp. that utilize inositol phosphates. Can. J. Microbiol. 43: 509-16.
- Rodriguez, H., and Fraga, R. 1999. Phosphate solubilizing bacteria and their role in plant growth promotion. Biotechnol. Adv. 17: 319-339.
- Sarikhani, M.R., and Malboobi, M.A. 2008. Phosphate solubilizing bacteria and genetics of phosphate solubilizing. 10th Genetics Congress. Tehran, Iran. (In Persian)
- Sarikhani, M.R., Malboobi, M.A., Aliasghar Zad, N., Greiner, R. and Yakhchali, B. 2010. Functional screening of phosphatase-encoding genes from bacterial sources. Iranian J. Biotech. 8: 4. 275-279.
- Sarikhani, M.R., and Aliasghar Zad, N. 2012. Comparative effects of two Arbuscular Mycorrhizal fungi and K fertilizer on tuber starch and potassium uptake by potato (*Solanum tuberosum* L.). Intl. J. Agric. Res. Rev. 2: 3. 125-134.
- Sundara, B., Natarajan, V., and Hari, K. 2002. Influence of phosphorus solubilizing bacteria on the changes in soil available phosphorus and sugarcane yields. Field Crops Res. 77: 43-49.

- Zabihi, H.R., Savagebi, G., Khavazi, K., and Ganjali, A. 2009. Response of wheat growth and yield to application of plant growth promoting rhizobacteria at various levels of phosphorus fertilization. *J. Agro. Res.* **7**: 1. 41-51.
- Zaidi, A. and Khan, M.S. 2006. Co-inoculation effects of phosphate solubilizing microorganisms and *Glomus fasciculatum* on green gram - *Bradyrhizobium* symbiosis. *Turkish J. Agri. Forestry.* **30**: 223-230.

Improvement of Wheat Phosphorus Nutrition Using Phosphate Solubilizing Bacteria

Mohammad Reza Sarikhani¹, Nasser Aliasgharzad², Mohammad Ali Malboobi³

1- Assistant professor, Department of soil science, University of Tabriz

2- Professor, Department of soil science, University of Tabriz

3- Associate Professor, Department of Plant Biotechnology, NIGEB

Phosphorus (P) is one of the most important nutrient elements for plant growth and it is usually accounted for second limiting factor for growth of plants next to nitrogen. Phosphate solubilizing microorganisms (PSM) play major roles for supplying soluble phosphate to plants in a more environmentally-friendly and sustainable manner. To evaluate the effect of phosphate solubilizing bacteria inoculation on growth of spring wheat cv. "Roshan" and also phosphorus uptake, a greenhouse experiment was conducted in sterile loamy soil in a completely randomized design with three replications. Four bacterial treatments were *Pseudomonas putida* P13 (P13), *Pantoea agglomerans* P5 (P5), *Pseudomonas fluorescence* CHAO (CHAO) and combination of P13+P5 and without inoculation as control. Data analysis on the fresh and dry weight of shoot (in the middle and end of growth), number of spikes and seed, weight of seed, concentration and content of P in shoot (in the middle and end of growth) and seed showed that bacterial treatments increased P concentration and content of wheat shoot ($p < 0.01$), and combination of P13+P5 treatment resulted in highest concentration and content of P. Maximum increasing of P concentration and content in shoot (1.8 and 1.14 fold in comparison with control, respectively) were observed in combination of P13+P5 treatment. Application of bacterial treatment did not have any increasing effect on dry matter, even though some parameters such as number of spikes, number of seed and weight of seed in some bacterial treatments (CHAO and P5) had high record compared to the control. Highest record of thousand grain weights was obtained in presence of P13+P5. However, the measured parameters such as fresh and dry weight of wheat and also P concentration and content in the middle of growth were not affected by application of bacterial inoculation. According to the results of this experiment we should expect to see the positive effect of PSM inoculation at the end of wheat growth since in the middle of growth it were distinguished no positive effect of PSM in wheat growth.

Key words: Phosphate Solubilizing Bacteria, Phosphorus, Wheat, Yield, Vegetative growth.