

۱۰ لیتر



کلسیم رویش ۶

CALCIUM ROUYESH.6

CaO	5%
MgO	1%
Total N	1%

معرفی

نسبت جذب سدیم (SAR) در مناطق خشک و نیمه خشک در آب و خاک به عنوان عامل محدود کننده رشد گیاه می باشد. معروف ترین روش کاهش نسبت جذب سدیم استفاده از سولفات کلسیم است. اما از آنجایی که حلالیت سولفات کلسیم معمولی بسیار کم است امکان استفاده از آن بسیار محدود می باشد. حلالیت بسیار بالا و مواد افزودنی خاص در محلول ضد شوری کلسیم رویش -۶ موجب کاهش مؤثر SAR می شود.

مزایا

- * حلالیت ۱۰۰ درصد در آب
- * کاهش چشمگیر شوری خاک ناشی از نمک های سدیمی
- * بهبود ساختمان و نفوذ پذیری بیشتر خاک در مقابل آب و هوا
- * قابلیت استفاده در سیستم های آبیاری تحت فشار و غرقابی

تجزیه ضمانت شده

کلسیم (CALCIUM)	منیزیم (MgO)	نیتروژن (Total N)
۵%	۱%	۱%

نحوه مصرف

نوع محصول	زمان مصرف	میزان مصرف
محصولات زراعی	یک هفته قبل تا هنگام کاشت و تکرار در صورت نیاز یک ماه بعد کاشت تا قبل از گلدهی	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار
درختان میوه (مرکبات، سیب، گلابی، گیلاس، زردآلو، انگور و ...)	مرحله اول قبل از کود دهی پاییزه و تکرار قبل از باز شدن جوانه برگ ها	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار
سایر گیاهان	مرحله اول قبل از کود دهی و تکرار پس از یک ماه	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار



توصیه های مهم

- * بهترین زمان مصرف، قبل از کود دهی و پس از مرحله آماده سازی زمین می باشد.
- * هنگام استفاده از این محصول آبیاری را به صورت سنگین اجرا نمایید.
- * در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
- * در خاک های با شوری بیش از ۱۲ دسی زیمنس، بهتر است از این محصول در دو مرحله و هر مرحله به میزان ۱۰ لیتر استفاده شود.
- * هنگام مصرف این محصول در نوبت آبیاری، از این هیچ نوع کود و یا سم دیگری در سیستم آبیاری استفاده نشود و آبیاری را بصورت سنگین انجام دهید.

